



Fågelleden



Sothönan har simflikar på tårna.
The Coot has partial webbing on its toes.



Skäggdopping med sin randiga unge på ryggen.
Great Crested Grebe with a striped youngling on its back.

Svart eller skäggig?

En kolsvart simfågel med vit panna och en högrest med yvigt, färgglatt skägg kan du se i Mjökuddstjärn på sommaren. Sothöna och skäggdopping!

En fläkt av södern

De två är inte så vanliga i Norrbotten. De finns bara i grunda, rika sjöar med mycket vass och andra vattenväxter. Sådana sjöar hittar vi främst nära kusten i områden som efter istiden låg under havet. Söderut är de två fåglarna vanligare.

Dyker

Båda dyker skickligt, men doppingen fiskar småfisk och sothönan äter växter. De kommer på våren vid islossningen och försvinner innan isen lägger på hösten.

Flyter

Båda bygger bon som flyter. Bona är byggda av vattenväxter. De följer med vattenståndet och dränks inte av högvatten.

ENGLISH

Black or Bearded?

A jet-black swimming bird with a white forehead and a tall bird with a colourful, bushy beard can both be seen on Mjökuddstjärn in the summer. The Coot (*Fulica atra*) and the Great Crested Grebe (*Podiceps cristatus*).

A Touch of the South

The Coot and the Great Crested Grebe are not common birds in Norrbotten. They only live in shallow, rich lakes with a lot of reeds and other aquatic plants.

Divers

Both birds are skilled divers but the Grebe hunts small fish and the Coot eats plants. They arrive when the ice breaks in the spring and disappear before the lake freezes in the autumn.

Floaters

Both birds build floating nests. The nests are made of aquatic plants. Floating nests follow the water level and are not flooded in high water.



LULEÅ KOMMUN



Medfinansierat av statliga bidrag